

FMC Latinoamérica S.A.
Av. Rodrigo de Chávez y Juan
Tanca Marengo. Ciudad Colon.
Torre Empresarial 2 - Piso 3.
Oficina 308
Guayaquil - Ecuador

Teléfono: (593 04) 3901953



Nombre: **HI-PHOS**

Enero 2021

Página 1 de 2

FICHA TECNICA

HI-PHOS

FERTILIZANTE QUIMICO

“APLICACIÓN FOLIAR Y DIRIGIDA AL SUELO”

REGISTRO NACIONAL 570-F-AGR
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Fosforo (P_2O_5)44,0 % p/v
Magnesio (MgO)8,0 % p/v
Potasio (K_2O)7,4 % p/v

“CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL”

GENERALIDADES

Hi-PHOS: Esta formulado para todo tipo de cultivos que les proporciona fósforo, potasio y magnesio en los momentos de máxima demanda. Hi-PHOS está especialmente indicado en aquellos momentos en que el cultivo tenga mayores dificultades para satisfacer sus requerimientos de fósforo por vía radicular.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	EPOCA DE APLICACION	VIA Y FRECUENCIA DE APLICACION
Tomate Riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>)	4,5 L/ha	Crecimiento vegetativo e inicio de etapa reproductiva o floración.	FOLIAR. Tres aplicaciones con rangos 7 días entre aplicación.
Aguacate (<i>Persea americana</i>)	1,5 L/ha	Inicio de brotación con masa foliar suficiente.	FOLIAR. Aplicar a partir de inicio de brotación con masa foliar suficiente. Puede repetirse en prefloración y a la menor dosis en maduración.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	1,0 L/ha	20 días después del trasplante o 25 días después de la emergencia de las plantas.	FOLIAR. Aplicar a partir de 20 días después del trasplante o 25 días después de la emergencia de las plantas, pudiendo repetir a extensión de espiga.
Banano (<i>Mussa acuminata</i> AAA)	1,0 L/ha	Trece semanas después de la siembra, dirigida al suelo, en la corona, semicírculo.	FOLIAR Y DIRIGIDA AL SUELO. Cuatro aplicaciones con un rangos de dos semanas entre aplicación.

Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	1,5 L/ha	Entre 4ª – 8ª hoja	FOLIAR. Aplicar cuando la planta tenga entre 4 y 8 hojas.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	1,5 L/ha	Brotación de yemas florales y/o prefloración.	FOLIAR. Aplicar a partir de inicio de brotación con masa foliar suficiente. Puede repetirse en prefloración y a la menor dosis en maduración.
Frutilla (<i>Fragaria</i> sp.)	1,5 L/ha	Brotación de yemas florales y/o prefloración.	FOLIAR. Aplicar a partir de inicio de brotación con masa foliar suficiente. Puede repetirse en prefloración y a la menor dosis en maduración.
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	1.5 L/ha	Brotación de yemas florales y/o prefloración.	FOLIAR. Aplicar a partir de inicio de brotación con masa foliar suficiente. Puede repetirse en prefloración y a la menor dosis en maduración.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	1,5 L/ha	Inicio de tuberización y llenado.	FOLIAR. Al inicio de tuberización y al inicio de llenado, repitiéndose si fuera necesario a partir del décimo día.
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	1,0 L/ha	Inicio de desarrollo vegetativo activo.	FOLIAR. Aplicar a partir de inicio de desarrollo vegetativo activo con masa foliar suficiente.

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

AGÍTESE BIEN ANTES ABRIR Y USARLO. El equipo de aspersión debe estar limpio. Llenar la mitad del tanque de pulverización con agua, comenzar la agitación y añadir la cantidad requerida de **Hi-Phos** y luego el resto del agua. Enjuague bien el envase y agregue los enjuagues al tanque, complete el llenado y aplique sin demora. Mantener la agitación del tanque durante todo el proceso de aspersión en el campo. No es recomendable aplicar este producto en condiciones de alta radiación solar o con temperaturas extremas y bajos niveles de humedad relativa ambiental. Si es posible realice las aplicaciones del producto a primera hora de la mañana o última de la tarde. Limpie bien el equipo de tratamiento después de su uso.

INCOMPATIBILIDAD

Hi-Phos es física y químicamente compatible con la mayoría de productos agroquímicos. Lea siempre cuidadosamente las etiquetas de terceros productos antes de mezclarse con Hi-Phos. Es recomendable hacer una pequeña prueba de compatibilidad con los productos que se quieran mezclar.

GUÍA PARA EL MÉDICO

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta cuando corresponda”



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

1800 VENENO (836366) Atención 24 horas del día

Para mayor información dirigirse a:

FMC LATINOAMÉRICA S.A. (593 04) 3901953 / Guayaquil - Ecuador