

SEAWINNER MICROBIAL

FICHA TÉCNICA

INFORMACION GENERAL

SEAWINNER MICROBIAL, es un complejo de *bacillus sp* con una concentración $1,1 \times 10^{10}$ UFC/Gramo de cepa bacteriana de aguas profundas y extracto adicional de algas, Mg y Ca. SEAWINNER MICROBIAL se usa ampliamente como fertilizante inoculante microbiano adicional para flores, verduras, frutas y cultivos de campo. Es especialmente adecuado para aquellas zonas donde los cultivos están expuestos a enfermedades graves en el suelo.

Previene enfermedades transmitidas por el **suelo** Inhibe el crecimiento de bacterias dañinas, promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas, mejora la inmunidad de los cultivos.

Promueve el acondicionamiento del suelo y el crecimiento de las raíces, Afloja el suelo, mejora la fertilidad y la capacidad de retención de humedad, así como promueve el crecimiento de las raíces.

Aumenta la eficiencia de los fertilizantes Promueve la fijación de nitrógeno, la disolución del fósforo y potasio.

METODO DE APLICACIÓN

SEAWINNNER MICROBIAL, debe ser aplicado en forma solución acuosa y directamente al suelo vía goteo o drench se puede utilizar junto con fertilizantes después de realizar una prueba de miscibilidad.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción ácida. Tome precaución al mezclar con soluciones con pH por abajo de 4,5 Es compatible con la mayoría de las soluciones de fertilizantes **No se recomienda** aplicar con fungicidas, bactericidas ni ningún tipo de fertilizantes biocidas como cobre iodo azufre.

Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Lea cuidadosamente la etiqueta completa.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Evite el contacto con la piel y la inhalación, use el equipo de protección adecuado.
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestre esta etiqueta.

ANALISIS GARANTIZADO

<i>Bacillus sp</i>	$1,1 \times 10^{10}$	UFC/g
ACIDO ALGINICO	1.47	% p/p
MANITOL	0,22	% p/p

Proveniente de las algas: *Enteromorpha intestinalis* y

Laminaria japonica

CULTIVO	Nombre Científico	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Esparrago	<i>Asparagus officinalis L</i>	2 kg/ha	Durante todo el ciclo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	2 kg/ha	Desarrollo vegetativo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo
Fresa	<i>Fragaria sp</i>	2 kg/ha	Durante todo el ciclo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo
Brocolí	<i>Brassica oleracea var. Itálica</i>	2 kg/ha	Durante todo el ciclo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo
Rosas	<i>Rosas spp.</i>	2 kg/ha	Durante todo el ciclo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo
Tomate Riñon	<i>Solanum lycopersicum</i>	2 kg/ha	Durante todo el ciclo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo
Pimiento	<i>Capcicum sp.</i>	2 kg/ha	Durante todo el ciclo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo
Banano	<i>Musa acuminata AAA.</i>	2 kg/ha	Durante todo el ciclo	Aplicación edáfica vía drench o riego por goteo

REG: 245-F-AGR-T