

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Km 1.5 Vía Durán – Tambo, Durán, Ecuador. Tel: (593) 4 2800 002 Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo, Cumbayá, Of. 306 Tel: (593) 4 2800 002
FORMULADOR:	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737. Teléf: (+86) - (531) - (88875320) / (+86) - (531) - (88875231) Email: rainbowagro@rainbowagro.com
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL N°:	295-F1/NA-CL3
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	250 ml, 500 ml, 750ml, 1L, 1.5 L, 1 gal, 2.5 L, 2.5 gal, 200L
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO ATENCIÓN 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Propamocarb hydrochloride.....625 g/l Fluopicolide.....62.5 g/l Aditivos c.s.p.....1 l
MODO DE ACCIÓN:	SUPICARB es un fungicida que combina dos principios activos: Fluopicolide con acción mesosistémica y protectante. Propamocarb hydrochloride con acción protectante.
MECANISMO DE ACCIÓN:	Fluopicolide: se desplaza hacia las puntas del tallo a través del xilema, pero no hacia las raíces. Propamocarb hydrochloride: Actúa principalmente inhibiendo la germinación de esporas.
GRUPO QUÍMICO:	Propamocarb hydrochloride: Carbamate

	Fluopicolide: Benzamide		
CÓDIGO FRAC:	Propamocarb hydrochloride: 28 Fluopicolide: 43		
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Densidad	pH	Presión de vapor
	1.13 g/cm ³	7.0 – 10.0	Propamocarb hydrochloride: 0.00000029 [mmHg] Fluopicolide: 6.0x10 ⁻⁹ mm Hg (25 °C)
	Solubilidad	K_{oc}	PM
	Propamocarb hydrochloride: 1005000 mg/l (20 °C) Fluopicolide: 2.8 mg/L	Propamocarb hydrochloride: 619 Fluopicolide: 8.3-373	Propamocarb hydrochloride: 224.73 g/mol Fluopicolide: 383.6 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 l/ha	14	12

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar con el apareamiento de los primeros síntomas de la plaga, realizar máximo 2 aplicaciones con intervalos de 7 días dependiendo de la presión de la plaga.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de **SUPICARB** en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Papa: 600 l/ ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

En caso de requerirse mezcla con otros productos, bajo responsabilidad del usuario, se recomienda hacer pruebas a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis y forma recomendada en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:

ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800

VENENO (836366) Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

SINOCHEMICAL S.A. Teléfono: 02-222 2575 / 0992500795-Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	27-03-2024	ECU