



CRYSTAL CHEMICAL DEL ECUADOR®

A4.01.FOR.07 Versión 26 may 21



NOMBRE COMÚN: Folpet + Dimethomorph

CONCENTRACIÓN: Folpet 600 g/kg

+Dimethomorph 113 g/kg.

FORMULACIÓN: Granulos Dispersables (WG)

TOXICIDAD: Categoría 4

LIGERAMENTE PELIGROSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: INTI® es fungicida de contacto y sistémico que contiene en su formulación la mezcla de Folpet + Dimethomorph, y controla enfermedades causadas por hongos del orden Peronosporales, como Phytophthora, Plasmopara y Peronospora.

MODO DE ACCIÓN: INTI® está compuesto por dos ingredientes activos: Dimethomorph fungicida sistémico con doble actividad curativa y Folpet fungicida protectante con doble actividad preventiva.

MECANISMO DE ACCIÓN: Dimethomorph inhibe la formación de Fosfolípidos que son precursores de la pared celular del patógeno, estos compuestos además son precursores energéticos y Folpet inhibe la formación de energía necesaria antes de la germinación con una doble acción protectante, al inhibir receptores de electrones (electrófilos) claves en el paso de los electrones, y procesos enzimáticos (aminoácidos) en el paso final de la respiración y obtención de ATP.

MODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de INTI®, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en agitación. No guarde la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC* (Período de carencia)
Rosa (<i>Rosa spp.</i>)	Mildeo veloso (<i>Peronospora sp.</i>)	1.0 g/l	No aplica

VOLUMEN DE AGUA: 12 litros por cama de 30m

*PC - Periodo de carencia: No aplica



DURÁN: Km 9 vía Durán - Tambo
Telfs.: (593 4) 371 3480
E-mail: ventas@crystalchemical.com.ec
Servicio al Cliente: 1800 - CRYSTAL
www.crystalchemical.com.ec



CRYSTAL CHEMICAL DEL ECUADOR®

A4.01.FOR.07 Versión 26 may 21

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

CONDICIONES DE APLICACIÓN: INTI® Verificar el buen funcionamiento del equipo de aspersión y preparación. La aplicación debe hacerse en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde y no se debe aplicar en ausencia de brisa fuerte, con altas temperaturas (sobre 28 °C) o fuerte insolación.

FITOTOXICIDAD: Usado a la dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad en cultivos ornamentales. Sin embargo, por el amplio número de variedades de rosas, se recomienda hacer una prueba en pequeña escala y descartar cualquier desorden fisiológico.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con sustancias oxidantes fuertes, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala, para garantizar su compatibilidad.

RESPONSABILIDAD: “El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

PRESENTACIONES: 600 g

REGISTRO: 203 – F2 / NA

FORMULADO POR:
NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

DISTRIBUIDO POR:
Crystal Chemical del Ecuador / Dupocsa, Protectores Químicos para el Campo S.A.



DURÁN: Km 9 vía Durán - Tambo
Telfs.: (593 4) 371 3480
E-mail: ventas@crystalchemical.com.ec
Servicio al Cliente: 1800 - CRYSTAL
www.crystalchemical.com.ec



CRYSTAL CHEMICAL DEL ECUADOR®

A4.01.FOR.07 Versión 26 may 21