



FICHA TÉCNICA

SEINEMA

www.agrosad.com.ec

SEINEMA



SEINEMA

Es un bioestimulante líquido de origen natural elaborado a base de extractos de alga marina (*Ascophyllum nodosum*) cuya riqueza en aminoácidos (Glutamina y Glicina) y Nitrógeno potencian el desarrollo de los cultivos. SEINEMA™ favorece el desarrollo radicular multiplicando la generación de raíces laterales y la emisión de pelos absorbentes. Así, se favorecen los procesos fotosintéticos de las plantas en general al tiempo que se mejora la absorción de nutrientes, se obtienen cultivos con más vigor y frutos más precoces, homogéneos y de mayor calidad. El producto está especialmente indicado para situaciones de estrés provocadas por agentes externos. En estas situaciones SEINEMA es capaz de estimular al cultivo para la superación del estrés y permitir un adecuado desarrollo del mismo en los niveles de crecimiento y producción.

Composición.

Características físicas

Formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Olor: Inoloro

Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Aminoácidos libres.....	7,32% p/v
Extracto de alagas.....	12,32% p/v
Manitol.....	0,43% p/v
Ácido Algínico.....	1,10% p/v

Grupo

Estimulante Natural



SEINEMA



Modo de empleo y dosis.

SEINEMA deberá ser aplicado a través del sistema de fertirrigación o en drench, dirigido a la zona radicular. Es aconsejable, adicionar **SEINEMA** al sistema de fertirrigación al final de los riegos, con la finalidad de evitar su lavado o de diluirlo en exceso, asegurándose en todo caso que el producto llegue a toda la zona radicular o bulbo húmedo. **SEINEMA** puede utilizarse en los cultivos recomendados, en las fases iniciales de desarrollo y después del trasplante. En cultivos ya establecidos, su uso se recomienda para revigorizar el desarrollo radicular y vegetativo en situaciones de estrés originadas por distintos motivos como excesos de salinidad, fitotoxicidades, sequías o heladas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA APLICACIÓN	VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Maíz (<i>Zea mays</i>)	3 l/ha	Pre-siembra, pos-siembra.	Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era en pre-siembra, 8 días antes. La 2da en pos-siembra a los 7 días y la 3era, 15 días después.
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)			Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era en pre-transplante, 8 días antes. La 2da en postransplante a los 7 días y la 3era, 15 días después.
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	2 l/ha		Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era en pre-siembra, 8 días antes. La 2da en pos-siembra a los 7 días y la 3era, 15 días después.
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	5 l/ha		Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era al inicio de la brotación. La 2da a los 7 días y la 3era, 15 días después.
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	3 l/ha		Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era en pre-siembra, 8 días antes. La 2da en pos-siembra a los 7 días y la 3era, 15 días después.
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i>)			Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era en pre-transplante, 8 días antes. La 2da en postransplante a los 7 días y la 3era, 15 días después.
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	5 l/ha		Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era al inicio de la brotación. La 2da a los 7 días y la 3era, 15 días después.
Palma (<i>Elaeis guineensis</i>)			Edáfica (drench y fertirrigación). La 1era al inicio de la brotación. La 2da a los 7 días y la 3era, 15 días después.

“La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo”.

MATRIZ CUENCA: Av. De las Américas y Agustín Cuesta

☎ (07) 2856 129 ☎ (07) 2856 130 📠 0997 229 124

✉ secretaria@agrosad.com.ec

SUCURSAL QUITO: Pan. Norte 0e8-701 Km. 14 ½ vía Calderón.

☎ (02) 2822 578 • (02)2822 523 • (02) 2023 730

✉ secretariaquito@agrosad.com.ec

SEINEMA



Compatibilidad

SEINEMA no debe mezclarse con productos ni aguas excesivamente ácidas o alcalinas, pudiéndose utilizar acondicionadores de agua, mojanteros o dispersantes. El pH óptimo de dilución es de 6-8. Los usos que se describen en esta ficha son recomendaciones basadas en experiencias realizadas por técnicos de campo en determinadas condiciones ambientales y de crecimiento, que pueden influir en la aplicación del producto. Una variación de esas condiciones podría producir efectos no previstos o distintos de los descritos. Por ello se aconseja la utilización del producto bajo la supervisión de un técnico con conocimientos adecuados. En caso de duda, antes de realizar una mezcla, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad. Después de utilizar **SEINEMA™**, evitar la aplicación inmediata posterior de cobres o desinfectantes químicos.

Estabilidad en el almacenaje

SEINEMA debe protegerse de temperaturas extremas. Mantenerlo en un intervalo de temperaturas ópticas de 5-40°C. Es estable bajo condiciones normales de almacenaje durante 2 años.

Categoría Toxicológica

No aplica

Presentación

Envase plástico de 1lt.

Almacenaje y manipulación

Almacenar en un sitio seguro, retirado de los alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco y seco). No almacene con la luz solar directa o cerca de fuentes de calor directo. Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante la preparación y utilización del producto NO COMER; BEBER o FUMAR. Usar el equipo de protección personal completo (overol, guantes, botas, mascarilla visor).

Observaciones

Para más detalles visite nuestro sitio web: www.agrosad.com.ec

O contáctese con nuestro servicio al cliente:

MATRIZ CUENCA: Av. De las Américas y Agustín Cuesta

☎ (07) 2856 129 (07) 2856 130 📠 0997 229 124

✉ secretaria@agrosad.com.ec

SUCURSAL QUITO: Pan. Norte 0e8-701 Km. 14 ½ vía Calderón.

☎ (02) 2822 578 • (02)2822 523 • (02) 2023 730

✉ secretariaquito@agrosad.com.ec

