

IDENTIDAD

Ingrediente activo: Hydrogen peroxide
Concentración: 350 g/L
Formulación: Concentrado soluble (SL)
Grupo químico: Compuesto inorgánico
Categoría: Fungicida Agrícola
Fórmula molecular: H₂O₂

Peso molecular: 34.01 g/mol
CAS No: 7722-84-1
Modo de acción: ---
Formulador: Agri-Growth International Inc.
Toxicidad: II – Moderadamente Peligroso
Antídoto: No tiene.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

TROPA® es un fungicida preventivo curativo, que actúa dañando las macromoléculas celulares, incluyendo lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

Es un desinfectante, fungicida de amplio espectro a base de peróxido de hidrógeno al 35%, combinación que reacciona con las enzimas y proteínas celulares de los organismos patógenos, y mediante una reacción de oxidación destruye todos los microorganismos.

INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones de uso para: Ecuador

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERIODO DE CARENICA
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Anublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.25 L/ha*	0 días
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.25 L/ha**	0 días
Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	Monilia (<i>Moniliophthora roreri</i>)	0,25 L/ha*	1 día

Volumen de agua: *Arroz y Cacao: 400 litros de agua
**Banano: 60 L/ha aplicación terrestre, 19 L/ha aplicaciones aéreas

FORMA DE APLICACIÓN

Arroz: El producto debe ser aplicado en dos ocasiones, en un intervalo de 7 días. La aspersión debe ser dirigida a las partes aéreas de las plantas cuando existan las condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.

Banano: El producto debe ser aplicado en dos ocasiones, en un intervalo de 7 días. La aspersión debe ser dirigida a las partes aéreas de las plantas cuando presente como máximo grado 2 en la hoja 3 según la escala de Preaviso Biológico.

Cacao: El producto debe ser aplicado en dos ocasiones, en un intervalo de 14 días. La aspersión debe ser dirigida a las partes aéreas de las plantas cubriendo en forma homogénea la mazorca y las ramas.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas para reingresar al área tratada.

INCOMPATIBILIDAD

Es incompatible con soluciones de metales Cu, Co, Mn, Fe, etc. Material proteico, lípidos, peroxidasas, catalasas, materia orgánica oxidable.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se siguen las instrucciones de uso recomendada y en los cultivos aprobados.

PRESENTACIONES COMERCIALES

250 mL, 1 L, 20 L, 5 Galones

PAÍS

ECUADOR

Nº DE REGISTRO

98-F2/NA

TITULAR DE REGISTRO: PUNTO VERDE S.A. PUNVERSA

CONTACTO:

PUNTO VERDE S.A.
AV. Constitución y Av. José Joaquín Orrantia
Edf. Business Plaza. Piso 8, Of. 801
Telf: 04-3885165 / 04-3885149
Guayaquil – Ecuador